



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109010665 A

(43)申请公布日 2018.12.18

(21)申请号 201811208154.4

A61K 35/586(2015.01)

(22)申请日 2018.10.17

(71)申请人 天津赛尔康生物医药科技有限公司

地址 300000 天津市滨海新区经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼N212-38

(72)发明人 王继明 高用慧 王博迪 王嘉毅

(74)专利代理机构 北京红福盈知识产权代理事务所(普通合伙) 11525

代理人 陈月福

(51)Int.Cl.

A61K 36/90(2006.01)

A61K 36/896(2006.01)

A61P 17/00(2006.01)

A61P 37/08(2006.01)

权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

一种治疗自体过敏性皮炎的中药配方及其制备方法

(57)摘要

本发明涉及治疗过敏性皮炎技术领域,公开了一种治疗自体过敏性皮炎的中药配方,所述中药配方按照重量份数计包括如下组分:升麻10-16份、鳖甲20-30份、桂枝10-18份、赤芍12-15份、白芍12-15份、土茯苓22-35份、黄柏8-15份、苦参8-18份;该中药配方服用见效快、治疗疗程短、标本兼治,治疗效果好;同时提供该中药配方的制备方法。

1. 一种治疗自体过敏性皮炎的中药配方,其特征在于,所述中药配方按照重量份数计包括如下组分:升麻10-16份、鳖甲20-30份、桂枝10-18份、赤芍12-15份、白芍12-15份、土茯苓22-35份、黄柏8-15份、苦参8-18份。

2. 根据权利要求1所述的一种治疗自体过敏性皮炎的中药配方,其特征在于,所述中药配方按照重量份数计包括如下组分:升麻15份、鳖甲30份、桂枝15份、赤芍15份、白芍15份、土茯苓30份、黄柏15份、苦参15份。

3. 根据权利要求1-2中任一项所述的一种治疗自体过敏性皮炎的中药配方的制备方法,其特征在于,所述中药配方的制备方法包括如下步骤:将鳖甲打碎后加水煎熬,先武火10分钟,煮沸后文火慢煎20分钟;其余组分先加水提前浸泡30分钟;待鳖甲煎熬后,两者混合,再武火10分钟,煮沸后文火慢煎20分钟,取药液即得。

4. 根据权利要求3所述的一种治疗自体过敏性皮炎的中药配方的制备方法,其特征在于,所述中药配方的制备方法包括如下步骤:将鳖甲打碎后加水煎熬,加水量为鳖甲总重量的15-20倍,先武火10分钟,煮沸后文火慢煎20分钟;其余组分先加水提前浸泡30分钟,加水至高过所述组分10-15cm;然后两种混合,待鳖甲煎熬后,两者混合,再武火10分钟,煮沸后文火慢煎20分钟,煎至300-500mL的药液即得。

5. 根据权利要求1所述的一种治疗自体过敏性皮炎的中药配方,其特征在于,所述中药配方一日分早晚两次服用,服用时间为饭后半小时。

6. 根据权利要求1所述的一种治疗自体过敏性皮炎的中药配方,其特征在于,所述中药配方用于治疗自体过敏性皮炎。

## 一种治疗自体过敏性皮炎的中药配方及其制备方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及治疗过敏性皮炎技术领域,具体涉及一种治疗自体过敏性皮炎的中药配方及其制备方法。

### 背景技术

[0002] 过敏性皮炎是由过敏原引起的皮肤病,主要是指人体接触到某些过敏源而引起皮肤红肿、发痒、风团、脱皮等皮肤病症。具体的过敏原可以分为接触过敏原、吸入过敏原、食入过敏原和注射入过敏原四类。每类过敏原都可以引起相应的过敏反应,主要的表现是多种多样的皮炎、湿疹、荨麻疹。过敏性皮炎主要的临床变现为皮肤以红、肿、热、痛、痒、红斑、水泡、头皮屑;对患者的正常生活造成严重影响。自体过敏性皮炎常发于四肢,发作时,浑身瘙痒难忍,若抓破皮肤,造成大面积感染;目前,治疗过敏性皮炎多采用西药擦涂缓解,易复发,难以根治。

### 发明内容

[0003] 本发明的发明目的在于提供一种治疗自体过敏性皮炎的中药配方,该中药配方服用见效快、治疗疗程短、标本兼治,治疗效果好;同时提供该中药配方的制备方法。

[0004] 为了实现上述发明目的,本发明采用的技术方案如下:

[0005] 一种治疗自体过敏性皮炎的中药配方,所述中药配方按照重量份数计包括如下组分:升麻10-16份、鳖甲20-30份、桂枝10-18份、赤芍12-15份、白芍12-15份、土茯苓22-35份、黄柏8-15份、苦参8-18份。

[0006] 在本发明中,进一步的,所述中药配方按照重量份数计包括如下组分:升麻15份、鳖甲30份、桂枝15份、赤芍15份、白芍15份、土茯苓30份、黄柏15份、苦参15份。

[0007] 在本发明中,进一步的,所述中药配方的制备方法包括如下步骤:将鳖甲打碎后加水煎熬,先武火10分钟,煮沸后文火慢煎20分钟;其余组分先加水提前浸泡30分钟;待鳖甲煎熬后,两者混合,再武火10分钟,煮沸后文火慢煎20分钟,取药液即得。

[0008] 在本发明中,进一步的,所述中药配方的制备方法包括如下步骤:将鳖甲打碎后加水煎熬,加水量为鳖甲总重量的15-20倍,先武火10分钟,煮沸后文火慢煎20分钟;其余组分先加水提前浸泡30分钟,加水至高过所述组分10-15cm;然后两种混合,待鳖甲煎熬后,两者混合,再武火10分钟,煮沸后文火慢煎20分钟,煎至300-500mL的药液即得。

[0009] 本发明的配方内服方法:所述中药配方一天早晚各一次餐后半小时服用;连服7天为一个疗程,七天完毕后停药两天,在进行下一个疗程,4个疗程为一个周期共计36天。轻度患者1-2疗程,中度患者3-5疗程,重度患者6-9疗程。

[0010] 本发明的配方不仅可以内服,而且还能制成外用药剂。

[0011] 将鳖甲粉碎磨粉,过100目筛,在压力10-25MPa、温度4-8℃进行超临界二氧化碳萃取,1-3h,得到鳖甲脂溶性提取物;所述鳖甲脂溶性提取物用体积浓度为95%无水乙醇回流提取2-3h,过滤,收集滤液;滤渣再次提取2-3次,合并滤液,真空旋蒸除溶剂,即得鳖甲的水

溶性提取物。

[0012] 将剩余的升麻、桂枝、赤芍、白芍、土茯苓、黄柏、苦参按照比例混合，加10倍量的75%乙醇浸泡8-12h，加热回流提取2-3h，过滤，收集滤液；减压除乙醇，将药渣加10倍量水煎煮，先武火10分钟，煮沸后文火慢煎20分钟，煎至50-100mL的药液即得该组合成分的中药提取物。

[0013] 将上述两种提取物混合，辅以赋形剂、添加剂、助剂等，制成药液或者膏剂，可擦拭于皮肤表面。

[0014] 在本发明中，进一步的，所述中药配方用于治疗自体过敏性皮炎。

[0015] 中医认为：过敏性皮炎是由于素体亏虚、饮食不节、劳役过度、精神刺激等伤及脾胃，致使气机失调，加之外感风、热、湿等病邪，使毒邪侵入皮肤、黏膜、甚至肌肉，与气血、津液、痰湿等郁结，久而化热，火热之邪其性向外向上，久则必然寻找出路，故而发病。

[0016] 本发明配方中：

[0017] 升麻：辛、甘，微寒；归肺、脾、大肠、胃经；发表透疹，清热解毒，升阳举陷；

[0018] 鳖甲：味咸，性微寒；归肝、肾经；滋阴潜阳，退热除蒸，软坚散结；

[0019] 桂枝：辛、甘，温；入肺、心、膀胱经；发汗解肌，温通经脉，助阳化气；

[0020] 赤芍：味苦，性微寒；归肝经；清热凉血，散瘀止痛；

[0021] 白芍：肝、脾、肺三经；补血敛阴，平肝止痛，主治头晕，胸胁疼痛、泻痢、月经不调；

[0022] 土茯苓：甘、淡，平；归肝、胃经；解毒，除湿，通利关节；

[0023] 黄柏：味苦，性寒；肾、膀胱经；有清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮的功效；

[0024] 苦参：味苦，性寒；归心、肝、胃、大肠、膀胱经；清热燥湿，杀虫，利尿；

[0025] 本发明的配方以鳖甲、桂枝为主，具有滋阴潜阳、退热除蒸、温通经脉的作用，养肝健脾、舒肝理气；升麻、赤芍、黄柏、苦参为辅，具有清热燥湿、解毒疗疮的作用，清热解毒、祛风除湿、疏风止痒；加之白芍、土茯苓，调味补缺，补血敛阴、解毒、除湿、通利关节；八味中草药共同作用，不仅有效巩固内部，养肝健脾、舒肝理气；而且清热解毒、祛风除湿、疏风止痒，佐以活血化瘀、透疹消疮；故而该中药配方标本兼治，服用见效快、治疗疗程短，治疗效果好。

## 附图说明

[0026] 图1为临床试验中其中一轻度患者服用本发明配方前的发病区症状图。

[0027] 图2为临床试验中该轻度患者服用本发明配方后的发病区症状图。

[0028] 图3为临床试验中其中一中度患者服用本发明配方前的发病区症状图。

[0029] 图4为临床试验中该中度患者服用本发明配方后的发病区症状图。

## 具体实施方式

[0030] 为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合实施例，进一步阐述本发明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0031] 本发明所用的原料均可从市面上购买。

[0032] 实施例1

[0033] 一种治疗自体过敏性皮炎的中药配方包括如下组分:升麻10g、鳖甲20g、桂枝10g、赤芍12g、白芍12g、土茯苓22g、黄柏8g、苦参8g。

[0034] 煎熬方法:将鳖甲打碎后加300ml水煎熬,先武火10分钟,煮沸后文火慢煎20分钟;其余组分先加水提前浸泡30分钟,加水至高过所述组分10cm;然后两种混合,待鳖甲煎熬后,两者混合,再武火10分钟,煮沸后文火慢煎20分钟,煎至300mL的药液即得。

[0035] 实施例2

[0036] 一种治疗自体过敏性皮炎的中药配方包括如下组分:升麻12g、鳖甲22g、桂枝10g、赤芍14g、白芍12g、土茯苓25g、黄柏10g、苦参10g。

[0037] 煎熬方法:将鳖甲打碎后加400ml水煎熬,先武火10分钟,煮沸后文火慢煎20分钟;其余组分先加水提前浸泡30分钟,加水至高过所述组分10cm;然后两种混合,待鳖甲煎熬后,两者混合,再武火10分钟,煮沸后文火慢煎20分钟,煎至400mL的药液即得。

[0038] 实施例3

[0039] 一种治疗自体过敏性皮炎的中药配方包括如下组分:升麻15g、鳖甲30g、桂枝15g、赤芍15g、白芍15g、土茯苓30g、黄柏15g、苦参15g。

[0040] 煎熬方法:将鳖甲打碎后加500ml水煎熬,先武火10分钟,煮沸后文火慢煎20分钟;其余组分先加水提前浸泡30分钟,加水至高过所述组分12cm;然后两种混合,待鳖甲煎熬后,两者混合,再武火10分钟,煮沸后文火慢煎20分钟,煎至400mL的药液即得。

[0041] 实施例4

[0042] 一种治疗自体过敏性皮炎的中药配方包括如下组分:升麻16g、鳖甲30g、桂枝18g、赤芍15g、白芍15g、土茯苓35g、黄柏15g、苦参18g。

[0043] 煎熬方法:将鳖甲打碎后加600ml水煎熬,先武火10分钟,煮沸后文火慢煎20分钟;其余组分先加水提前浸泡30分钟,加水至高过所述组分15cm;然后两种混合,待鳖甲煎熬后,两者混合,再武火10分钟,煮沸后文火慢煎20分钟,煎至500mL的药液即得。

[0044] 大量临床研究证明来考察本发明中药配方的作用效果:

[0045] 观察2005年-2017年期间共136例急慢性复发性过敏性皮炎患者,其中女性84例、男性52例,所有患者都有使用其他方法的治疗史,但都有反复的特征。治疗期间停用其他治疗手段。

[0046] 治疗方法:将上述患者分批服用实施例1-4煎熬方法得到药液:将上述药液分两次服用,早晚各一次餐后半小时服用;连服7天为一个疗程,七天完毕后停药两天,在进行下一个疗程,4个疗程为一个周期共计36天。轻度患者1-2疗程,中度患者3-5疗程,重度患者6-9疗程。

[0047] 记录相关数据,具体情况及治疗效果如表1所示:

[0048] 表1

[0049]

序号	轻度患者	中度患者	重度患者
1	共计 15 例, 服用实施例 1 制备的药液, 2 疗程后, 红肿减退, 瘙痒消除, 其余症状与体征也全部解除; 并随诊 1 年未复发者;	共计 11 例, 服用实施例 1 制备的药液, 1-3 疗程后, 红肿明显减退, 4-5 疗程后, 全部症状与体征也全部解除; 并随诊 1 年, 1 例出现轻微复发, 再次服用 2 疗程后痊愈;	共计 8 例, 服用实施例 1 制备的药液, 1-3 疗程后, 红肿明显减退, 5-7 疗程后, 大部分症状消除, 轻微红肿; 7-9 疗程后, 全部症状与体征也全部解除; 并随诊 1 年, 1 例出现轻微复发, 再次服用 2 疗程后痊愈; 1 例出现两次复发, 再次服用 2 疗程后痊愈。
2	共计 13 例, 服用实施例 2 制备的药液, 1-2 疗程后, 红肿减退, 瘙痒消除, 其余症状与体征也全部解除; 并随诊 1 年未复发者;	共计 10 例, 服用实施例 2 制备的药液, 1-3 疗程后, 红肿明显减退, 4-5 疗程后, 全部症状与体征也全部解除; 并随诊 1 年未复发者;	共计 9 例, 服用实施例 2 制备的药液, 1-3 疗程后, 红肿明显减退, 5-7 疗程后, 大部分症状消除, 轻微红肿; 7-9 疗程后, 全部症状与体征也全部解除; 并随诊 1 年, 1 例出现轻微复发, 再次服用 2 疗程后痊愈;
3	共计 15 例, 服用实施例 3 制备的药液, 1-2 疗程后, 红肿减退, 瘙痒消除, 其余症状与体征也全部解除; 并随诊 1 年未复发者;	共计 12 例, 服用实施例 3 制备的药液, 1-2 疗程后, 红肿减退, 瘙痒消除, 其余症状与体征也全部解除; 并随诊 1 年未复发者为痊愈;	共计 9 例, 服用实施例 3 制备的药液, 1-3 疗程后, 红肿明显减退, 5-7 疗程后, 大部分症状消除, 轻微红肿; 7-9 疗程后, 全部症状与体征也全部解除; 并随诊 1 年未复发者为痊愈;

[0050]

4	共计 14 例, 服用实施例 4 制备的药液, 2 疗程后, 红肿减退, 瘙痒消除, 其余症状与体征也全部解除; 并随诊 1 年未复发者;	共计 12 例, 服用实施例 4 制备的药液, 1-2 疗程后, 红肿减退, 瘙痒消除, 其余症状与体征也全部解除; 并随诊 1 年, 1 例出现轻微复发, 再次服用 2 疗程后痊愈;	共计 8 例, 服用实施例 4 制备的药液, 其中 7 例, 1-3 疗程后, 红肿明显减退, 5-7 疗程后, 大部分症状消除, 轻微红肿; 7-9 疗程后, 全部症状与体征也全部解除; 并随诊 1 年未复发者为痊愈; 有 1 例, 服用药液 9 疗程后, 全部症状与体征明显减退, 但未全部解除
---	---	--	---

[0051] 由表1及附图1-4可见, 本发明实施例1-4制备的药液对过敏性皮炎确有很好的缓解、修复作用, 轻度患者在1-2疗程后, 症状与体征也全部解除, 并且随诊1年未复发者; 中度

患者和重度患者也在服用本发明药液后大多数得到了明显改善,复发也减少;仅1例虽然没痊愈,红肿瘙痒等不适症状与体征明显减退;同时,本实验中未发现患者出现其他不适的情况。

[0052] 本发明并不局限于前述的具体实施方式。本发明扩展到任何在本说明书中披露的新特征或任何新的组合,以及披露的任一新的方法或过程的步骤或任何新的组合。



图1




图2





图3



图4