

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(12) **ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**

(21)(22) Заявка: 2017134443, 04.03.2016

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:

04.03.2015 US 62/128,472;

25.09.2015 US 62/232,644

(43) Дата публикации заявки: 04.04.2019 Бюл. № 10

(85) Дата начала рассмотрения заявки РСТ на национальной фазе: 04.10.2017

(86) Заявка РСТ:

US 2016/021015 (04.03.2016)

(87) Публикация заявки РСТ:

WO 2016/141341 (09.09.2016)

Адрес для переписки:

105082, Москва, Спартаковский пер., 2, стр. 1,  
секция 1, этаж 3, ЕВРОМАРКПАТ

(71) Заявитель(и):

**ВАНДА ФАРМАСЬЮТИКЛЗ ИНК. (US)**

(72) Автор(ы):

**ПОЛИМЕРОПОУЛОС Михаэль Х. (US),****ЛИКАМЕЛЕ Луис Уильям (US)**(54) **СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАДИПИТАНТА**

## (57) Формула изобретения

1. Способ введения традипитанта пациенту, который в этом нуждается, включающий внутреннее введение пациенту традипитанта в количестве и с частотой введения, которые достаточны для достижения и поддержания концентрации в плазме >100 нг/мл.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что концентрацию в плазме >100 нг/мл выбирают из группы, состоящей из: 125 нг/мл или более, 150 нг/мл или более, 175 нг/мл или более, 200 нг/мл или более и 225 нг/мл или более на протяжении выполнения режима лечения.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что этап внутреннего введения представляет собой пероральное введение.

4. Способ введения традипитанта пациенту, который в этом нуждается, включающий внутреннее введение пациенту традипитанта в количестве от 85 до 170 мг/день.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что он дополнительно включает внутреннее введение пациенту традипитанта в количестве 85 мг раз в день (qd).

6. Способ по п. 4, отличающийся тем, что он дополнительно включает внутреннее введение пациенту традипитанта в количестве 85 мг дважды в день (bid).

7. Способ по п. 4, отличающийся тем, что он дополнительно включает внутреннее введение пациенту традипитанта в количестве 100 мг раз в день (qd).

8. Способ введения традипитанта пациенту, который в этом нуждается, включающий внутреннее введение пациенту традипитанта в количестве от 50 до 200 мг дважды в день (bid).

9. Способ введения традипитанта пациенту, который в этом нуждается, включающий внутреннее введение пациенту традипитанта в количестве от 50 до 150 мг дважды в день (bid).

10. Способ введения традипитанта пациенту, который в этом нуждается, включающий внутреннее введение пациенту традипитанта в количестве от 50 до 100 мг дважды в день (bid).

11. Способ по любому из пп. 1-10, отличающийся тем, что традипитант вводят для лечения зуда.

12. Традипитант для применения при лечении зуда посредством внутреннего введения пациенту, страдающему от зуда, посредством внутреннего введения пациенту традипитанта согласно способу по любому из пп. 1-10.

13. Традипитант для применения в производстве лекарственного средства для лечения зуда посредством внутреннего введения пациенту традипитанта согласно способу по любому из пп. 1-7.

A 201713443 RU

RU 201713443 A